

Nypa fruticans (Nypa houštinatá)

synonyma: *Cocos nypa*, *Nipa arborescens*, *Nipa fruticans*, *Nipa litoralis*, *N. var. neameana*

čeleď: Arecaceae

oblasti: Bangladéš, Brunej, Filipíny, Hainan, Indie, Japonsko, Jáva, Kambodža, Karibik, Malajsie, Melanésie, Nigérie, Panama, Papua-Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam, Západní Papua

Roste na pobřeží v Tichomoří a Indickém oceánu. Stonek roste vodorovně v bahnu a v průměru má až 60cm. Listy dosahují délky až 9m, jsou ploše zpeřené, na každé straně je 50 - 100 pichlavých úkrojků. Kvete ve zkráceném, 0,3 - 1,2 (i 2)m dlouhém latovitém květenství, samčí květy jsou umístěné v postranních žlutých nebo červených jehnědách či klasech, samičí jsou terminální, seskupené do kulovitého tvaru o průměru 15 - 25cm. Plodem je hrozen dřevnatějících oříšků o délce až 10cm seskupené v plodenství připomínajícím palcát. Mladé výhonky a nezralé plody jsou jedlé a šíří se vodou.

Je adaptovaná na prostředí mangrovů v bahnitém mořském pobřeží.

<https://www.rostliny.net/>