

Lonicera stanantha

synonyma: *Lonicera coerulea kirilowii*, *Lonicera coerulea* var. *edulis*, *Lonicera karelinii*, *Lonicera kirilowii*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Himálaj, J Rusko, Pákistán, Ťan-šan, Z Sibiř

Roste na západní Sibiři, ruské střední Asii a Himálaji v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5m. Borka se odlupuje v úzkých pruzích, na starších větvích a na kmeni je naředlá nebo nažloutlá, u mladších větví načervenalá nebo žlutohnědá. Větvě jsou štíhlé, v mládí krátce sametově ochlupené, někdy i s delšími chlupy anebo částečně štětinaté, vzácně holé, pupeny jemně ochlupené až holé, hnědé nebo růžově hnědé. Palisty se objevují vzácně. Listy jsou úzce eliptické až dlouze eliptické, špičaté až zašpičatělé, na sterilních větvích někdy kopinaté se zaoblenou nebo mírně srdčitou bází, někdy dlouze obvejčité, kožovité, bledě nebo nasivěle zelené, dlouhé 1,5 - 5 (i 7)cm, široké 0,5 - 2 (i 3)cm, báze uťatá až zakulacená, spodní strana bledší, v mládí přitiskle krátce ochlupená (i holá) a řapíky jsou hustě ochlupené, dlouhé 1,5 - 3 (i 7)mm. Květy jsou párovité, mají 0,7 - 1cm stopku, listeny jemně ochlupené, stopkatě žláznaté, dlouhé 3 - 5mm, kalich má pysky zvlňené, brvitě, trubkovitě nálevkovitá, koruna je nažloutlá, dlouhá 1,2 - 1,6 (i 2,1)cm, trubka dlouhá, štíhlá a laloky eliptické nebo vejčité. Plodem bývají kulovité, vzácně mírně protažené, tmavě modré bobule délky 0,7 - 1,4cm a obsahují semena délky 2,2 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>