

Lonicera buschiorum

synonyma: *Lonicera coerulea*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Kavkaz

Patří mezi endemity Kavkazu. Borka na starších exemplářích šedá, na mladších žlutohnědá nebo šedohnědá, odlupuje se v tenkých pruzích. Mladé větve jsou tlusté, dlouze ochlupené se štětínami, na konci roku jsou růžovohnědé nebo hnědé, pupeny stejné barvy, bývají ochlupené. Listy jsou dlouze eliptické až dlouze vejčité či dlouze obvejčité, na fertálních dlouhé 1,7 - 6,5cm, široké 0,7 - 3cm, na sterálních dlouhé až 7,5cm, široké až 4,5cm, konec tupý až krátce zašpičatělý, báze klínovitá nebo zaoblená, často i srdčitá, povrch kožovitý, horní strana tmavězelená, spodní nasivělá a bledší, obě strany krátce přitiskle ochlupené, spodní více kolem centrálního žebra, horní bývá holá a řapíky jsou ochlupené, dlouhé 2 - 5mm, listeny čárkovitě šídlovité, štětínatě ochlupené, drobně stopkatě žláznaté, kališní lem holý nebo na okraji drobně žláznatý s vejčitými tupými laloky, koruna je dlouhá 1,3 - 1,5cm, vnější strana hustě dlouze ochlupená, trubkovitě nálevkovitá. Plody jsou dlouze eliptické nebo široce eliptické, dlouhé 1 - 1,1cm a obsahují plochá semena délky 2 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>