

## Lonicera chamissoi (Zimolez Chamissoův)

synonyma: *Caprifolium chamissoi*, *Lonicera nigra*, *Lonicera riederiana*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Japonsko, Kamčatka, S Asie, Sachalin, SV Čína

Roste na Sachalinu, Mandžusku, Kamčatce, Kurilských ostrovech a Japonsku v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Borka je šedá. Větve jsou rozkladité, štíhlé, jednoduché nebo řídce větvené, hustě olistěné, v mládí holé, zimní pupeny vejčitéklínovité, zašpičatělé a holé. Listy bývají eliptické až obvejčité, dlouhé 2,2 - 5,5 (i 8)cm, široké 1 - 3 (i 4)cm, krátce zašpičatělé nebo tupé, báze zaoblená nebo srdčitá, někdy klínovitá, horní strana zelená, spodní světlejší, obě strany holé nebo na okraji brvitě a řapíky jsou holé, dlouhé do 1,5mm. Květy jsou tmavě růžovofialové až tmavěfialové, koruna je dlouhá 0,9 - 1,2cm, horní pysk rozeklaný ne podlouhleeliptické nebo eliptické tupé laloky, stopky jsou dlouhé 0,6 - 1,4cm, listeny šídlovité nebo 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1,5mm, listeny dlouhé 0,5 - 1mm, okrouhlé nebo vejčité, obvykle srostlé v párech, kališní okraj rozeklaný na eliptické tupé laloky a semeníky jsou baňkovité. Plody jsou červené, kulaté, srostlé, obsahují 2 - 5 plochých nažloutlých eliptických semen délky 3mm a šířky 2mm.

<https://www.rostliny.net/>