

## Flueggea tinctoria (Řešetlák barvířský)

synonyma: *Acidoton buxifolius*, *Adelia virgata*, *Colmeiroa buxifolia*, *Rhamnus buxifolia*, *Rhamnus tinctoria*, *Securinega buxifolia*, *Securinega tinctoria*, *Securinega virgata*, *Villanova buxifolia*

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Andalusie, JV Evropa

Roste v jihovýchodní Evropě v podobě široce 1/2kulatého řidšího keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou vstřícné i střídavé, šedé nebo světle hnědé a v mládí ochlupené. Palisty jsou šídlovité a dlouho vytrvalé. Listy jsou střídavé, eliptické až úzce obvejčité, tupé, drobně pilovité, tmavě zelené, lesklé, dlouhé (0,8 -) 1,5 - 2 (i 5)cm a široké (0,8 -) 1,8 - 3cm, báze je klínovitá a žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek. Květenstvím je 5 - 10tkvětý svazeček, vlastní květy jsou krátce stopkaté, žlutě zelené, zvonkovité, kališní cípy jsou 3úhle kopinaté a mají (4 -) 6 (i 8) korunních lístků délky 1,5mm. Plodem je černá nebo žlutá peckovice délky 5 - 7mm a obsahuje vejčitá semena délky 4 - 5mm.

<https://www.rostliny.net/>