

Lonicera iliensis

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: J Rusko

Roste v ruské střední Asii v podobě rozkladitého keře. Větve jsou štíhlé, pevné, svírají úhel 60 - 90°. Borka starých větví je šedá, vláknitá, odlupuje se v dlouhých pruzích, na 2letých větvích šedá nebo žlutohnědá, mladé fertlní větve štíhlé, dlouhé 2,5 - 5cm, hustě krátce sametově ochlupené, stejně tak i na řapících, pupenech a listenech, zimní pupeny téměř špičaté, dlouhé do 5mm. Palisty jsou vzácné, dlouhé 2,5 - 3,5mm. Listy fertlních větví jsou dlouhé 0,8 - 3,5cm, široké 0,2 - 1cm, ale obvykle menší délky 2 - 2,5cm, úzké, čárkovitě podlouhlé až úzce eliptické, vzácně širší, konec špičatý nebo tupý, báze zaobleně klínovitá (i úzce klínovitá nebo zaoblená), zelené, na spodní straně bledší, obě strany drobně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Listeny jsou dlouhé 4 - 7mm, kališní lem krátce řídce ochlupený, koruna má délku 0,9 - 1,4cm, vnější strana je ochlupená, trubka někdy hustě ochlupená, nálevkovitá, laloky lemu prodlouženě vejčité a tupé. Plody jsou složené, kulovité nebo mírně protažené, dlouhé 5 - 7mm a obsahuje dlouze eliptická semena délky 2mm a šířky 1mm.

<https://www.rostliny.net/>