

Crepis capillaris (Škarda vláskovitá)

synonyma: *Berinia pinnatifida*, *Berinia stricta*, *Crepis agrestis*, *Crepis bauhiniana*, *Crepis candollei*, *C. f. bischoffii*, *C. f. integra*, *Crepis diffusa*, *Crepis druceana*, *Crepis gaditana*, *Crepis hastata*, *Crepis leiosperma*, *Crepis linifolia*, *Crepis lusitanica*, *Crepis nemorum*, *Crepis parviflora*, *Crepis pinnatifida*, *Crepis umbellata*, *Crepis uniflora*, *Crepis variabilis*, *Crepis virens f. integra*, *Crepis virens subsp. agrestis*, *Crepis virens subsp. capillaris*, *Crepis virens var. diffusa*, *Lapsana capillaris*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze severní a části střední Evropy. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,1 - 0,8 (i 1)m. Listy jsou kracovitě přenoklané, na bázi s třásnitými ouškyv horní části čárkovité. Kvete ve vrcholíku na 2 - 10cm stopce v úbořech žlutými květy o průměru 1 - 1,5cm, zákrovy jsou dlouhé 5 - 7 (i 8)mm, široké 3 - 6mm, po odkvětu vejčité baňkovité, vnější zákrovní listeny jsou prakticky přitisklé a na vnitřní straně holé. Plodem je nažka délky 1,4 - 2,5mm s bílým chmýrem délky 3,5 - 4mm.

Vyhovují mu okraje cest, louky, atp. Zemina stačí běžná hlinitá, nejlépe bohatá na živiny, zejména N.

<https://www.rostliny.net/>