

## Crepis foetida (Škarda smrdutá)

synonyma: *Anisoderis foetida*, *Arnosaris foetida*, *Barkhausia candollei*, *Barkhausia divaricata*, *Barkhausia echioides*, *Barkhausia foetida*, *Barkhausia glanduligera*, *Barkhausia graveolens*, *Barkhausia hirta*, *Barkhausia pinguis*, *Barkhausia prostrata*, *Barkhausia rodigioides*, *Barkhausia schimperi*, *Barkhausia triangularis*, *Barkhausia zacinthia*, *Berinia foetida*, *Chondrilla decandollei*, *Crepis amygdalina*, *Crepis fallax*, *Crepis foetens*, *C. subsp. maritima*, *C. subsp. radicata*, *C. subsp. zacinthia*, *Crepis glanduligera*, *Crepis gracilis*, *Crepis graveolens*, *Crepis insularis*, *Crepis interrupta*, *Crepis kotschyana*, *Crepis radiata*, *Crepis radicata*, *Crepis rodigioides*, *Crepis schimperi*, *Crepis thracia*, *Crepis zacinthia*, *Hieraciodes schimperi*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Gruzie, Írán, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Kavkaz, Massachusetts, Německo, Švýcarsko, Wisconsin

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Lodyha je ochlupená. Listy jsou ochlupené, kracovitě peřenoklané až 2x peřenosečné. Kvete žlutými květy v úborech (před rozkvetem zpravidla převislé) seskupených do lat na 2 - 7cm stopce, zákrov je zvonkovitý, dlouhý 0,9 - 1,3cm a široký 7 - 9mm. Plodem je nažka, vnější jsou dlouhé 6 - 9mm, mají 12 žeber s krátkým zobákem, vnitřní jsou dlouhé 1 - 1,6cm, mají 20 žeber, dlouhý slabý zobánek a chmýr má délku 4,5 - 7mm. Při mnutí vydává nepříjemný zápach. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *commutata*

- subsp. *foetida* (Škarda smrdutá pravá) - zákrov za květu úzce válcovitě zvonkovitý, 1,5 - 1,8x delší než široký, vnější zákrovní listeny mají délku 1/4 - 1/2 vnitřních, chlupy na vnitřních zákrovních listenech bývají z většiny jemné, kadeřavé, smíšené se žláznatými chlupy bez štětinatých; vápencové skály, pastviny

- subsp. *glandulosa*

- subsp. *rheadifolia* (Škarda smrdutá mákolistá) - jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie; výška 10 - 50cm; v horní části přisedlé peřenosečné listy; zákrov za květu široce zvonkovitý, 1 - 1,5x delší než široký, vnější zákrovní listeny mají délku 1/2 - 3/4 vnitřních chlupy na vnitřních zákrovních listenech bývají z většiny štětinaté, u báze ztlustlé, s příměsí jemných chlupů, zřídka žláznaté; chráněný druh C3; okraje cest, suché trávníky, vinice

Vyhovují mu okraje cest, náspy, atp.

<https://www.rostliny.net/>