

Crepis nana

synonyma: Askellia nana, Askellia nana subsp. ramosa, Barkhausia nana, Barkhausia nana var. lyratifolia, Crepis humilis, C. subsp. nana, C. subsp. ramosa, C. subsp. typica, C. var. lyratifolia, C. var. ramosa, Crepis racemosa, Hieracioides nanum, Prenanthes polymorpha var. flaccida, Prenanthes polymorpha var. integrifolia, Prenanthes polymorpha var. lyrata, Prenanthes polymorpha var. pygmaea, Prenanthes pygmaea, Youngia pygmaea var. flaccida, Youngia pygmaea var. lyrata, Youngia pygmaea var. nana

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Montana, Nevada, Newfoundland, Nunavut, Oregon, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Pochází ze severu Severní Ameriky a Asie z alpínských poloh. Dosahuje výšky několika cm. Listy mají červené tečkování, oválný tvar občas s málo laloky podél krajů. Na konci stonku se nachází 2 - 4 žluté květy.

Vyhovuje mu písčitá půda.

<https://www.rostliny.net/>