

Crepis vesicaria (Škarda pampeliškolistá)

synonyma: *Barkhausia hiemalis*, *Barkhausia intybacea*, *Barkhausia leucorhodia*, *Barkhausia macrophylla*, *Barkhausia nicaeensis*, *Barkhausia praecox*, *Barkhausia raphanifolia*, *Barkhausia reflexa*, *Barkhausia scariosa*, *Barkhausia vesicaria*, *Crepis bicolor*, *Crepis heterocarpa*, *Crepis hiemalis*, *Crepis macrophylla*, *Crepis muricata*, *Crepis raphanifolia*, *Crepis scariosa*, *Crepis taraxacoides*, *C. var. longiseta*, *C. var. pectinata*, *C. var. ramosissima*, *C. var. recognita*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Německo, New York, Oregon, Pennsylvania, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Švýcarsko

Dorůstá výšky 0,1 - 1m. Květenství má 2 - 10cm stopku, zákrov je zvonkovitý, dlouhý 0,8 - 1,5cm, široký 5 - 8mm a koruna je žlutá. Plodem je nažka délky 5 - 9mm s chmýrem délky (3,5 -) 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *andryaloides*
- subsp. *bivonana* - endemit Itálie
- subsp. *hyemalis* - endemit Itálie
- subsp. *myriocephala*
- subsp. *stellata*
- subsp. *taraxacifolia* - výška 20 - 80cm; listy vykrajovaně zubaté, až 2x peřenosečné; květenstvím je žlutý úbor, ze spodní strany červeně proužkovaný, zákrov je max. měkce černě ochlupený, vnější zákrovní listeny min. na začátku přitisklé, okraj široce blanitý; plodem je nažka s chmýrem 2x delším než zákrov (5 -) 6 - 9mm
- subsp. *vesicaria* (Škarda pampeliškolistá pravá)

<https://www.rostliny.net/>