

Lonicera steveniana

synonyma: *Lonicera caucasica*, *Lonicera xylosteum*, *Xylosteum dodonaei*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze a Malé Asii v podobě vzpřímeného keře. Borka je černošedá. Větve jsou v mládí štíhlé, někdy prutovité, zelené nebo načervenalé až fialové, obvykle šedě ojněné nebo řídce ochlupené. Listy jsou dlouze eliptické, dlouhé 1,8 - 10cm, široké 1,2 - 5cm, na koncích pozvolna zúžené, pouze spodní listy mají občas zaoblenou bázi a tupý konec, horní strana zelená, holá nebo řídce ochlupená, spodní bledší, jemně krátce zkadeřeně ochlupená, řapíky jsou štíhlé, měkce ochlupené a dlouhé 0,3 - 1cm. Listeny jsou úzce kopinaté nebo čárkovitě kopinaté, zašpičatělé, listence okrouhle žláznaté, ochlupené, někdy téměř holé, kališní okraj rozeklaný na dlouhé vejčité až vejčitěkopinaté laloky, koruna má délku 0,8 - 1,2cm, je žlutobílá, na vnější straně ochlupená, trubka štíhlá, uvnitř ochlupená a semínky bývají úzké. Plodem je kulovitá bobule obsahující zploštělá eliptická semena délky 3 - 3,5mm.

<https://www.rostliny.net/>