

# Lonicera turczaninowii

synonyma: *Lonicera caerulea* var. *glabrescens*

čeleď: *Caprifoliaceae*

oblasti: S Korea, SV Čína, V Čína, V Rusko, V Sibiř

Roste na východní Sibiři, ruském Dálném východu, Mandžusku a severní Koreji v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m (vzácně i více). Borka je šedá, v mládí tmavohnědá nebo žlutohnědá. Větve vyrůstají obvykle téměř v pravém úhlu, fertilní jsou v mládí krátké, štíhlé, hustě krátce ochlupené, měkce bíle štětinovitě hnědě ochlupené, později holé, pouze na spodu vytrvale ochlupené, vzácně od počátku holé, pupeny krátce ochlupené, někdy odstále ochlupené. Palisty bývají malé, dlouhé 0,2 - 0,8 (i 1,2)cm, žilkované, listy dlouhé 1,3 - 5cm, široké 0,5 - 2,5cm, na sterilních větvích dlouhé až 6,5 - 8cm, široké 3,5cm, široké, eliptické až široce eliptické, dlouze vejčité, někdy dlouze eliptické, na sterilních větvích obvykle tupé, báze klínovitá, bledězelená, na spodní straně světlejší, mladé listy z obou stran přitiskle ochlupené, později na horní straně bývají holé, na spodní straně řídce ochlupené, listy sterilních větví někdy z obou stran holé a řapíky dlouhé 1,5 - 5mm. Listeny jsou nitkovitě šídlovité až úzce čárkovité, dlouhé 3 - 9mm, kališní okraj holý nebo kolem okraje řídce žláznatý, koruna žlutobílá, dlouhá 0,9 - 1,2cm, trubkovitě nálevkovitá, laloky dlouze vejčité až kopinaté. Plodem je dlouze eliptická 0,8 - 1,3cm bobule obsahující eliptická semena délky 2 - 2,2mm a šířky 1,5 - 1,7mm.

<https://www.rostliny.net/>