

Kalopanax pictus

synonyma: *Acanthopanax acerifolium*, *Acanthopanax ricinifolium* var. *maximowiczii*, *Acanthopanax ricinifolius*, *Acer septemlobum*, *Brassiopsis ricinifolia*, *Kalopanax autumnalis*, *Kalopanax ricinifolius*, *Kalopanax septemlobus*, *Panax ricinifolium*, *Tetrapanax ricinifolium*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Japonsko, Korea, Sachalin, Sibiř, SV Čína, V Čína

Pochází z Číny, Japonska, Sibiře, Koreji a Sachalinu. Roste v podobě stromu (u nás obvykle jako keř). Dorůstá výšky do 30m. Borka je šedá, dřevo žluté, používané v nábytkářství. Větve jsou tlusté, na povrchu má silné kuželovité ostny. Listy jsou téměř okrouhlé, dlanitě 5 - 7 (i 9)ti laločné (vzácně hluboce laločnaté), široké 10 - 25 (i 40)cm, laloky pilovité, 3úhlé nebo dlouze vejčité, tmavězelené, spodní strana bledší, v mládí mírně ochlupené a řapíky dlouhé 8 - 50cm. Kvete bílými až žlutozelenými drobnými 5tičetnými květy seskupenými do 20 - 30cm lat ze složených stopkatých okolíků, stopky jsou dlouhé 0,5 - 1cm a korunní lístky oválně eliptické. Plodem je kulovitá černá peckovice velikosti 4 - 5mm se štíhlou čnělkou a obsahuje 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *lutchuensis* - listy holé

- var. *magnificus*/*Acanthopanax acerifolium* - Čína, Japonsko; větve mírně trnité nebo bez trnů; listy široké 15 - 35cm, mírně vejčité laločnaté, na spodní straně hustě ochlupené (zejména kolem žilek)

- var. *maximowiczii*/*Aralia maximowiczii* - Čína, Japonsko; listy hluboce 5 - 7milaločnaté, laloky dlouze kopinaté, na spodní straně hustě ochlupené

- var. *septemlobus* - listy široké 9 - 25, laloky 3úhle vejčité až dlouze vejčité, na spodní straně v mládí ochlupené

<https://www.rostliny.net/>