

Lembotropis nigricans (Čilimníkovec černající)

synonyma: *Cytisus nigricans*, *Cytisus unibracteatus*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Itálie, Střední Evropa, Z Balkánský poloostrov

Roste v jižní a střední Evropě v podobě beztrnného hustého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2 (i 2)m při průměru kmínků do 2cm. Větve jsou rýhované, zelené v mládí ochlupené. Borka je hnědá. Listy jsou 3četné, vlastní lístky podlouhlé, obvejčité až eliptické, dlouhé 1 - 3cm, báze klínovitá nebo zaoblená, konec tupý až mírně zašpičatělý, horní strana tmavězelená, holá, spodní bledězelená, přitiskle ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 2cm. Kvete žlutými květy ve vrcholových 15 - 85 (i 100)tičetných vrcholových hroznech dlouhých 6 - 30cm, stopky květů jsou hustě ochlupené, kalich zvonkovitý, hustě ochlupený. Plodem je zploštělý černohnědý přitiskle ochlupený lusk délky 2 - 3,5cm obsahující mírně zploštělá hnědá a lesklá ledvinovitá semena délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australis*/*Cytisus nigricans* var. *australis* - Itálie, západní Balkán; větve hustě bíle ochlupené; květenství krátké, několikakvěté
- var. *elongatus* - remontuje na podzim na koncích větví
- subsp. *nigricans* (Čilimníkovec černající pravý) - větve přitiskle téměř hedvábně ochlupené; hrozny květenství bohaté, protáhlé

Vyhovují mu kamenité až hlinité stráně, obvykle kyselé, okraje lesů či křovin, atp. se sušší půdou chudou na dusík.

<https://www.rostliny.net/>