

Parthenocissus semicordata

synonyma: *Parthenocissus cuspidifera* var. *pubifolia*, *Parthenocissus himalayana*, *Parthenocissus himalayana* var. *rubrifolia*, *Parthenocissus himalayana* var. *vestita*, *P.* var. *rubrifolia*, *Psedera himalayana*, *Vitis himalayana*, *Vitis himalayana* var. *semicordata*, *Vitis rubrifolia*, *Vitis semicordata*, *Vitis semicordata* var. *himalayana*

čeleď: Vitaceae

oblasti: Guizhou, Hubei, Myanmar (Barma), Pákistán, Shaanxi, Sichuan, Sikkim, Thajsko

Roste v Číně, Indii, Pákistánu, Myanmaru a Thajsku v podobě dřevnaté liány. Větve jsou kulaté, v mládí řídce ochlupené a úponky mají 4 - 6 větví. Palisty jsou kopinaté, přitisklé, opadavé a dlouhé 4mm. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé (3,5 -) 5 - 15cm, řídce ochlupené, lístky téměř přisedlé, centrální obvejčité, ostře špičaté, zubaté, dlouhé 6 - 12 (i 13)cm, široké 3 - 6 (i 7)cm, báze klínovitá, postranní lístky vejčité eliptické, dlouhé 5 - 10cm, široké 3 - 5cm, báze asymetrická, zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, které jsou na spodní straně ochlupené. Květenství má 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm stopku, vlastní žlutě zelené 5tičetné květy mají délku i šířku 2mm, stopky dlouhé 2 - 3mm, korunní lístky vejčité a dlouhé 2,5mm. Plodem je kulatá bobule průměru (4 -) 6 (i 8)mm a obsahuje 1 - 2 (i 4) obvejčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *rubifolia* - Guizhou, Hubei, Sichuan a Shaanxi; poupata a listy v mládí růžové
- var. *semicordata*/*Ampelopsis himalayana*/*P. himalayana*/*P. himalayana* var. *vestitus*/*Psedera himalayana*/*Vitis himalayana*/*Vitis semicordata* - Čína, Indie, Myanmar, Thajsko, Sikkim; poupata zelenavá

<https://www.rostliny.net/>