

Ficus goldmanii

synonyma: *Urostigma verrucosum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, V Mexiko, Z Mexiko

Roste v Belize, Guatemale, Kostarice, Nikarague, Panamě, Hondurasu, Mexiku a Salvadoru v podobě stromu s nízkým kmenem a rozkladitou korunou. Větve jsou holé nebo téměř holé. Palisty jsou krátké, na vnější straně hedvábné, drobně ochlupené, dlouhé 0,9 - 1,5 (i 2,7)cm a široké 3 - 6mm. Listy jsou podlouhlé až elipticky oválné, dlouhé (5,5 -) 7 - 18 (i 27)cm, široké (2,5 -) 4 - 10 (i 13,5)cm, kožovité, zaoblená či tupé, báze tupá nebo úzce zaoblená, žilnatinu tvoří (5 -) 7 - 12 (i 13) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3,5cm. Plody jsou kulovité, drobně ochlupené nebo olysalé, v průměru mají 1,5 - 2,5cm a lůžko je krátce stopkaté.

<https://www.rostliny.net/>