

# Acokanthera oblongifolia

synonyma: *Acokanthera oblongifolia*, *Acokanthera spectabilis*, *Acokanthera venenata* var. *spectabilis*, *Carissa oblongifolia*, *Carissa spectabilis*, *Jasminoneryium oblongifolium*, *Toxicophlaea spectabilis*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Honduras, KwaZulu-Natal, Mosambik, Pákistán, V Austrálie, Východní Kapsko

Roste v jižní Africe a Mosambiku v podobě stálezeleného rozložitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky (3 -) 3,5 - 7 (i 15)m a téměř stejné šířky. Borka je tmavěšedá a drsná. Větve jsou vzpřímené. Listy jsou vstřícné, široce eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, kožovité, lesklé, tmavězelené, zaoblené, dlouhé 6 - 12cm, široké 2,5 - 6cm, na spodní straně světlejší, centrální žebro vyniklé, žilnatina málo patrná, okraj celokrajný, podvinutý, bez široce zúžená až zaoblená a řapíky jsou dlouhé do 1cm. Kvete v krátkých hustých svazečcích v paždí listů, vlastní květy jsou vonné, bílé, narůžovělé, korunní lístky dlouhé 5 - 7mm, trubka štíhlá a dlouhá do 2cm. Plody jsou dužnaté, červené až narůžovofialověločerné, vejčité až okrouhlé, dlouhé 2,5cm, připomínají olivy a obsahují 1 - 2 semena. Je jedovatá. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - menší; listy šedozeleně až béžovobílé panašované, v mládí narůžovělé

Vyhovují mu suché lesy, pobřežní duny a teplo.

<https://www.rostliny.net/>