

Acokanthera oppositifolia (Akokantera vstřícniolistá)

synonyma: *Acokanthera lamarckii*, *Acokanthera longiflora*, *Acokanthera rhodesica*, *Acokanthera venenata*, *Carissa acokanthera*, *Carissa longiflora*, *Carissa oppositifolia*, *Cestrum oppositifolium*, *Cestrum venenatum*, *Garcinia sciura*, *Pleiocarpa hockii*, *Toxicophlaea cestroides*, *Toxicophlaea thunbergii*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Etiopie, J Afrika

Roste v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 7m. Borka je hnědá, drsná, později hluboce rýhovaná. Listy jsou lesklé, eliptické až mírně obvejčité, špičaté nebo tupé, zahrocené, holé, okraj podvnutý, dlouhé 5 - 15cm, široké 3 - 8,5cm, báze klínovitá nebo zaoblená, v mládí červené, později mírně lesklé, tmavězelené, na spodní straně světlejší, někdy načervenalé, okraj podvnutý a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,2cm. Kvete v hustých vrcholících, vlastní květy jsou vonné, bílé, trubka růžová, dlouhá 0,6 - 1,9cm, laloky dlouhé 2 - 3mm. Plody jsou červené nebo růžovofialové, dužnaté, vejčité či eliptické, dlouhé 1,3 - 3cm a široké 0,8 - 2,2cm. Všechny části jsou jedovaté a na jed neexistuje protijed.

<https://www.rostliny.net/>