

Plantago coronopus (Jitrocel vraní nožka)

synonyma: *Arnoglossum subulatum*, *Asterogeum laciniatum*, *Coronopus vulgaris*

čeleď: Plantaginaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Egypt, Francie, Grónsko, Gruzie, Írán, Irsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Libanon, Libye, Lucembursko, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Massachusetts, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Nový Brunšvik, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, S Itálie, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Washington

Roste ve středozeší jako jednoletka nebo víceletka. Dorůstá výšky (2 -) 5 - 20 (i 50)cm. Povrch je ochlupený. Listy vytváří přizemní růžici, obrysem jsou obkopynaté až podlouhlé s peřenosečnými až eliptickými nebo čárkovitými úkrojky, dlouhé (2 -) 3 - 10 (i 12)cm a široké 0,2 - 1,5cm. Květenstvím je válcovitý klas délky 3 - 10cm, vlastní květy jsou 4četné, mají zadní kališní cípy s křídlatým ochlupeným okrajem, kališní lístky jsou dlouhé 2,3 - 3mm, korunní trubka je bělavá, krátce ochlupená, dlouhá 1,8 - 3mm a cípy jsou zpětně ohnuté. Plodem je tobolka délky 2,2 - 3mm obsahující 3 - 4 semena délky 0,8 - 1,6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ceratophylla*
- subsp. *coronopus* (Jitrocel vraní nožka pravá)
- subsp. *commutata*

Vyhovují mu zasolené půdy.

<https://www.rostliny.net/>