

Rumex acetosa (Šťovík kyselý)

synonyma: *Acetosa agrestis*, *Acetosa amplexicaulis*, *Acetosa angustata*, *Acetosa bidentula*, *Acetosa fontanopaludosa*, *Acetosa hastifolia*, *Acetosa hastulata*, *Acetosa magna*, *Acetosa officinalis*, *Acetosa olitoria*, *Acetosa pratensis*, *Acetosa pratensis* subsp. *fontanopaludosa*, *Acetosa subalpina*, *R. subsp. biformis*, *R. subsp. fontanopaludosus*, *R. var. fontanopaludosus*, *Rumex biformis*, *Rumex fontanopaludosus*

čeleď: Polygalaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,6 (i 1)m. Kořeny sahají hluboko pod zem. Listy mají oválný tvar se zvlněnými okraji a kyselou chuť. V přízemní listové růžici mají délku 7 - 15cm. Horní listy jsou menší a přisedlé. Kvete ve štíhlých latách. Plody jsou dlouhé i široké 3,2 - 4mm. Obsahuje velké množství vitamínu C. Je významným producentem pylu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acetosa*
- subsp. *ambiguus*
- subsp. *amplexicaulis*
- subsp. *arifolius*
- subsp. *hibernicus*
- subsp. *hirtulus*
- subsp. *vinealis*

Roste na loukách a trávnicích s půdou bohatou na živiny, zejména na dusík.

<https://www.rostliny.net/>