

## Scadoxus multiflorus

synonyma: *Amaryllis multiflora*, *Haemanthus abyssinicus*, *Haemanthus andrei*, *Haemanthus arabicus*, *Haemanthus arnoldianus*, *Haemanthus bequaertii*, *Haemanthus bivalvis*, *Haemanthus ceciliae*, *Haemanthus colchicifolius*, *Haemanthus cruentatus*, *Haemanthus delagoensis*, *Haemanthus eurysiphon*, *Haemanthus filiflorus*, *Haemanthus kalbreyeri*, *Haemanthus lynesii*, *Haemanthus micrantherus*, *Haemanthus mildbraedii*, *Haemanthus multiflorus*, *Haemanthus nicholsonii*, *Haemanthus otaviensis*, *Haemanthus rupestris*, *Haemanthus sacculus*, *Haemanthus seretii*, *Haemanthus somaliensis*, *Haemanthus tenuiflorus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *coccineus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *mocambicensis*, *Haemanthus zambesiacus*, *Nerissa multiflorus*

čeleď: Amaryllidaceae

oblasti: Ghana, Jemen, KwaZulu-Natal, Libérie, Mosambik, Namibie, Saudská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Súdán, Svazijsko, Zimbabwe

Roste na Arabském poloostrově, dále od Senegalu po Súdán a na jih do JAR. Dorůstá výšky 10 - 70cm, v době květu až 1,1m. Pod zemí vytváří cibuli. Listy vyrůstají po 3 - 5ti ks, jsou dužnaté, oválné, tmavězelené, při bázi červeně skvrnitě a dlouhé 10 - 20cm. Kvete až po uschnutí listů, květenství je až 200četné, kulovité, průměru 20cm, podepřené blanitým listem, vlastní květy 6tičetné, červenooranžové, dlouze trubkovité s 3úhlými cípy a tyčinek má 6. Plodem je bobule. Je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *katharinae* - jihovýchodní Afrika; nejvyšší druh; výška až 1,1m; listy jsou dlouhé až 70cm
- subsp. *multiflorus* - drobnější; suché savany a plné slunce
- subsp. *longitubus* - Ghana, Libérie a Sierra Leone

Vyhovují mu okraje lesů, křoviny, savany, atp. v polostínu a s dobře propustnou půdou bohatou na živiny. Na zimu krátkodobě snese až -11°C, ale ideální teplota je 10°C. Zálivka se provádí až po mírném proschnutí substrátu.

<https://www.rostliny.net/>