

Sedum telephium (Rozchodník nachový)

synonyma: Anacampseros albida, Anacampseros arguta, Anacampseros aurigerana, Anacampseros beugesiaca, Anacampseros borderi, Anacampseros buxicola, Anacampseros conferta, Anacampseros convexa, Anacampseros dumeticola, Anacampseros julliana, Anacampseros lapidicola, Anacampseros lugdunensis, Anacampseros monticulorum, Anacampseros navieri, Anacampseros praecelsa, Anacampseros purpurea, Anacampseros pycnantha, Anacampseros repens, Anacampseros rhodanensis, Anacampseros rubella, Anacampseros rupifraga, Anacampseros saxifraga, Anacampseros subalbida, Anacampseros triphylla, Anacampseros viridula, Anacampseros vogesiaca, Anacampseros vulgaris, Hylotelephium argutum, Hylotelephium argutum subsp. carpaticum, Hylotelephium carpaticum, Hylotelephium jullianum, Hylotelephium maritimum, Hylotelephium purpureum, Hylotelephium sanguineum, Hylotelephium telephium, Hylotelephium telephium subsp. fabaria, Hylotelephium triphyllum, Hylotelephium vulgare, Hylotelephium zhiguliense, Sedum argutum, Sedum carpaticum, Sedum jullianum, Sedum maritimum, Sedum maximum, Sedum mugodscharicum, Sedum purpurascens, Sedum purpureum, Sedum sanguineum, S. f. purpureum, S. subsp. fabaria, S. subsp. purpureum, S. var. purpurascens, S. var. purpureum, Sedum triphyllum

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Altaj, Česká republika, Irsko, Katalánsko, Kazachstán, Německo, Polsko, Švýcarsko

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Listy jsou ztučnělé, ploché, vejčitého tvaru s nepravidelným okrajem. Kvete v latě. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Carl'
- subsp. fabaria
- 'Frosty Morn'
- 'Herbstfreude' - tmavěrůžové květy
- 'Choclite'
- 'Matrona' - červené listy
- subsp. maximum (Rozchodníkovec žlutokvětý) - poupaty jsou fialově skvrnitá, vnitřní strana bílá nebo nažloutlá
- 'Purpleemperor'
- 'Ruby Glow'
- subsp. ruprechtii
- 'Habgray'

- 'Strawberries and Cream'

Potřebuje plné slunce a sucho, štěrkový substrát nebo skalní pukliny, atp. V zimě nadzemní části odumírají.