

Cynoglossum lanceolatum

synonyma: *Cynoglossum abyssinicum*, *Cynoglossum canescens*, *Cynoglossum formosanum*, *Cynoglossum formosanum* f. *albiflorum*, *Cynoglossum hirsutum*, *Cynoglossum hispidum*, *C. f. albiflorum*, *Cynoglossum micranthum*, *Cynoglossum platyphyllum*, *Cynoglossum racemosum*, *Echinosperrum paniculatum*

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Afrika, Čína, Indie, Jemen, Kašmír, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Srí Lanka

Roste od Afriky po Čínu a Malajsii v podobě dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky do 1,2m. Stonek je bohatě větvený a ochlupený. Přízemní listy jsou řapíkaté, kopinaté, oboustranně ochlupené, dlouhé 10 - 20cm, široké 2 - 4cm, spodní strana žilnatá, lodyžní listy jsou podobné, ale menší. Květenství je krátce stopkaté, prodlužující se na 3mm v době plodu, kališní laloky jsou hustě ochlupené, za plodu dlouhé do 2mm, koruna je bleděmodrá až téměř bílá s vejčitými zašpičatělými laloky a hrdlo je širší než delší. Plodem je kulatá tvrdka velikosti 2mm.

<https://www.rostliny.net/>