

Rhus vernix (Škumpá laková)

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě Kanady a USA v podobě vzpřímeného 1/2kulatého hustého keře (i stromu). Dorůstá výšky do 3 (i 7)m. Větve jsou v mládí oranžové a ochlupené, později světlešedé. Listy jsou zpeřené, tvoří je 5 - 13 lístků, vlastní lístky jsou eliptické až mírně podlouhlé, špičaté, tmavězelené, dlouhé 4 - 10cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek, spodní strana je namodralá, řapíčky jsou dlouhé 5 - 9mm a na podzim se barví do červenooranžové. Květenstvím je úzká převislá lata délky 8 - 20cm, vlastní květy jsou žlutozelené, kališní lístky tupě 3úhle kopinaté, dlouhé 1,3mm, široké 0,7mm, korunní lístky jsou mírně kopinaté, dlouhé 2,5mm a široké 0,5 - 1mm. Plody jsou kulovité, široké 5mm, žlutobílé a obsahují semena délky 3,5mm a šířky 5mm.

<https://www.rostliny.net/>