

Crataegus microphylla (Hloh drobnolistý)

synonyma: *Crataegus coccinea*, *Crataegus laevigata* subsp. *microphylla*, *Crataegus lagenaria*, *Crataegus lagenaria* var. *orthosepala*, *Crataegus lagenaria* var. *transcaucasica*, *C.* var. *dolichocarpa*, *Crataegus monogyna* var. *dolichocarpa*, *Crataegus monogyna* var. *pinnatiloba*, *Crataegus orthosepala*, *Crataegus orthosepala* var. *glabra*, *Crataegus pinnatiloba*, *Crataegus pinnatiloba* var. *sphaerocarpa*, *Mespilus monogyna* var. *lagenaria*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Írán, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze, v Íránu, Krymu a Malé Asii v podobě úzkého keře. Větve jsou v mládí zpravidla holé, růžovofialovohnědé, později šedohnědé a mají trny délky 0,5 - 1,2cm. Palisty jsou srpovité a zastříhovaně pilovité. Listy jsou slabé, dlouhé 1 - 3cm, široké 1 - 2,8cm, na sterilních větvích větší, vejčité, bledězelené, v mládí oboustranně ochlupené, báze uťatá až klínovitá, spodní listy na fertálních větvích široké, 3úhle vejčité, 3laločné, centrální lalok je 3klaný, postranní jsou tupé, ostatní listy jsou 5 - 7midílné, zpravidla dlouze vejčité, laloky jsou prakticky tupé, drobně pilovité a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,6cm. Květenstvím je 4 - 10tikvětý chocholík, může být ochlupený, vlastní květy mají 2 - 3,5cm stopku, průměr 0,8 - 1,3cm, kališní lístky jsou krátké, 3úhle vejčité a špičaté. Plody jsou prakticky kulaté až hruškovité, červené, velké 0,9 - 1,2cm a mají 1 pecičku.

<https://www.rostliny.net/>