

Platycerium (Parožnatka)

synonyma: Alcicornium, Neuroplatyceros

čeleď: Polypodiaceae

Rostou jako epifyty na stromech v Africe, Asii a Austrálii. Proto je vhodné pěstovat je v závěsných nádobách. Parožnatky jsou charakteristické plochými parožnatě dělenými listy do tvaru vidliček. Na povrchu se vytváří povlak, který se nesmí žádným způsobem odstraňovat! Listy se dělí do dvou skupin:

- sterilní (neplodné) listy - naleznete je v nejnižší úrovni rostliny
- fertilní (plodné) listy

Menší rostliny v našich podmínkách můžete zkusit pěstovat jako epifyt, dospělejší je však již nutné umístit do substrátu. Jako substrát můžete použít běžnou humózní zeminu. Druhou alternativou je směs listovky a rašeliny. Zalévá se do dutiny, kterou vytváří listy. Mezi zálivkami nechávejte kořeny trochu proschnout. Možné je taky rostlinu 1x týdně ponořit na 30min do odstáté vody s pokojovou teplotou. Rostlina vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost, proto roste každý den. Důležité je umístění na světlém místě, ovšem bez přímého slunečního světla v období léta. Na zimu jí vyhovuje teplota 10°C a na léto 15 - 22°C.

Množí se v přírodě výtrusy. Toto množení se vám ale nejspíše v našich podmínkách nezdaří. Občas se vytvářejí odnože, které pak můžete k množení použít. Nejznámější je *Platycerium Bifurcatum*.

Platycerium alcicorne (Parožnatka parohatá)

oblasti: Madagaskar, Mosambik, V Afrika, Zimbabwe

Roste na Madagaskaru, Seychelských a Komorských ostrovech, Mosambiku a Zimbabwe.

Platycerium andinum

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe.

Platycerium angolense (Parožnatka angolská)

oblasti: Angola

Má nedělitelné na krajích zvlněné fertilní listy.

Platynerium bifurcatum (Parožnatka vidličnatá)

oblasti: Havajské ostrovy, Jáva, JV Austrálie, Nová Guinea, Nová Kaledonie, SV Austrálie, V Austrálie

Pochází z Austrálie, Indonésie, Nové Kaledonie a Nové Guineje. Patří mezi epifyty. Podobá se *P. grande*, nemá však tak velké listy. Listy mohou dosáhnout i několikametrové délky, ale růst je pomalý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bifurcatum*/var. *bifurcatum* (Parožnatka vidličnatá pravá) - východní Austrálie; dokáže růst i v subtropickém prostředí, odolává i teplotám nízko nad 0°C
- subsp. *hillii* - potřebuje vlhko a teplo
- 'Mt. Lewis'

- 'Hula Hands'
- 'Roberts'
- subsp. *veitchii* - stříbřitá barva; skalnatá místa
- var. *willinckii* - Indonésie, Nová Guinea, Jáva

Pro pěstování je ideální pokojová teplota 18 - 23°C. Zimním minimem je 15°C. Zálivka by měla být bohatá. Nechávejte ovšem trochu proschnout kořeny. Jedna z možností zálivky je 1x týdně kořenový bal ponořit na čtvrt hodiny do nádoby s odstátou vodou a po okapání umístit na původní místo. Protože vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost, je nutné rosit každý den. Přesazuje se každý 2. rok. Starší rostliny nepřesazujte vůbec.

Hnojí se 1x měsíčně roztokem z kravince. V našich podmínkách lze množit pouze odnožemi, které rostlina občas vytvoří. Dávejte ale pozor, aby odnož měla již vytvořený vlastní kořenový systém.

Platynerium coronarium (Parožnatka věncová)

oblasti: Filipíny, Indonésie, Malajsie, Myanmar (Barma), Vietnam

Pochází z oblastí Myanmaru až po Filipíny. Roste na stromech přisedlá na kmeni jako epifyt. Fertilní hluboce vykrojené vidličnaté listy dosahují až 3m šířky i délky.

Vyžaduje vlhko a teplota nesmí klesnout pod 15°C.

Platynerium elephantotis (Parožnatka sloní)

oblasti: Tropická Afrika

Roste v tropické Africe. Dorůstá výšky 60 - 70cm a do šířky i více.

Platynerium ellisii (Parožnatka Ellisova)

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Platycerium grande (Parožnatka obrovská)

oblasti: JV Asie, S Austrálie

Pochází z jihovýchodní Asie a ze severní Austrálie. Je poněkud robustnější než *P. bifurcatum*. Dosahuje výšky několika decimetrů. Listy jsou vzpřímené s laločnatými okraji.

Platycerium hillii (Parožnatka Hilliova)

oblasti: V Austrálie

Roste v Austrálii. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Bloom'

Platycerium holttumii

oblasti: Asie

Roste v Asii.

Platycerium madagascariense (Parožnatka madagaskarská)

oblasti: Madagaskar

Listy jsou charakteristické svou žilnatinou. Má ráda chladnější prostředí.

Platycerium quadridichotomum

Platycerium ridleyi (Parožnatka Ridleiova)

oblasti: Indonésie, Malajsie

Roste v Malajsii a Indonésii jako epifyt.

Vyžaduje vlhko a teplota nesmí klesnout pod 18°C.

Platycerium stemaria (Parožnatka Stemarova)

oblasti: Střední Afrika, Tropická Afrika, Z Afrika

Roste v západní a střední Africe.

Platycerium superbum (Parožnatka nádherná)

oblasti: Havajské ostrovy, Nový Jižní Wales, Queensland

Pochází z Austrálie. Patří mezi epifyty.

Vyhovuje mu prostředí deštného pralesa.

Platycerium veitchii

oblasti: Austrálie

Pochází z tropické Austrálie.

Platycerium wallichii

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku jako epifyt.

Platycerium wandae

oblasti: Asie

Roste v Asii.

Platycerium willinkii

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/paroznatka>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/paroznatka-platycerium/>

<http://www.celysvet.cz/paroznatka.php>

<http://www.domek.cz/clanky/zeleny/kvetiny/paroznatka/Default.htm>

<https://www.rostliny.net/>