

Cichorium intybus (Čekanka obecná)

synonyma: Cichorium balearicum, Cichorium byzantinum, Cichorium cicorea, Cichorium commune, Cichorium divaricatum, Cichorium glabratum, Cichorium glaucum, Cichorium hirsutum, C. f. alba, C. f. crispum, C. f. rubicunda, C. f. sativum, C. subsp. balearicum, C. subsp. foliosum, C. subsp. glabratum, C. subsp. glaucum, C. subsp. sativum, C. var. callosum, C. var. foliosum, C. var. glabratum, C. var. glabrum, C. var. longipes, C. var. radicosum, C. var. sativum, Cichorium officinale, Cichorium perenne, Cichorium rigidum, Cichorium sylvestre

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Euroasii jako trvalka. Dokáže dorůst výšky 0,3 - 1,3 (i 2)m. Kořen je kúlovitý. Po pražení může sloužit jako poněkud hořká náhražka kávy. Stonek je větvený, chlupatý. Mladé listy jsou poživatelné a vhodné pro přidání do salátu. Vytvářejí přízemní růžici, spodní listy mají kracovitý tvar, na spodní straně ochlupené, šupinky chmýru 8 - 10x kratší než nažka, v horní části jsou kopinaté, mírně zubaté. Kvete světle modrofialovými (i bílými nebo růžovofialovými) květy v úborech o průměru 3 - 4cm na mírně tlusté stopce. Plodem je nažka délky 2 - 2,8mm s chmýrem délky 0,2 - 0,8mm. Kořeny lze využít pro náhražku kávy. Používá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. foliosum (Listová čekanka/Hlávková čekanka/Čekanka salátová) - pochází ze středozemí; salátová zelenina; samosprašná (i cizosprašná) dvouletka; dlouhý vřetenovitý nažloutlý řepovitý kořen; lodyha hranačná výšky (0,5 -) 1 - 1,2 (i 1,5)m; listy celokrajné, asymetricky mělce vykrajované zubaté, vytvářejí přízemní růžici; květy bleděmodré v úboru o průměru 4 (i 5)cm; plodem je obvejčitá nažka; k rychlení čekankových puků se používá i hydroponie, provádí se na podzim po odstranění vnějších listů; snáší teploty do -7°C; podle barvy listů se dělí na skupiny:
 - 'Zuckerhut' - zelenolisté
 - 'Radicchio' - červenolisté

- var. intybus (Čekanka obecná pravá) - výška 20 - 70cm; přízemní listy kracovitě peřenoklané; úbory průměru 3cm; suchá travnatá místa, okraje cest, atp.
- var. sativum (Kořenová čekanka/Čekanka obecná setá/Cikorka) - používá se pro náhražku kávy

Vyhovují ji okraje silnic, mýtiny a jiná otevřená stanoviště. Půda vyhovuje suchá, kamenitá, hlinitopísčitá, bohatá na živiny.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>