

# Eryngium maritimum (Máčka přímořská)

synonyma: Eryngium marinum

čeleď: Apiaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Dánsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Irsko, Island, Izrael, J Řecko, JZ Rusko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Maroko, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Ontario, Polsko, Portugalsko, S Itálie, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, SV Evropa, Sýrie, Švédsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Virginie

Roste ve středozeří a u Černého moře jako dvouletka až trvalka s keřovitým až 1/2kulatým habitem s namodralým povrchem min. na vrcholu. Dorůstá výšky i šířky (15 -) 20 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří jedlý plazivý oddenek. Stonek je přímý, tuhý, hodně rozvětvený. Listy vytvářejí růžici, jsou v obrysu prakticky kulaté, kožovité, stříbrošedé, 3 - 5x laločnaté, s trnitými okraji, přízemní dlouhé 5 - 15cm, široké 8 - 17cm, vytváří 2 - 5 lodyžních s přisedlou až 1/2objímavou bází a s výškou se zkracují. Květenstvím je jednoduchý stažený 1/2kulatý okolík či strboul o průměru 1,5 - 3cm se šedomodrými listeny, vlastní květy jsou kovově modré, zákrovní listy jsou vejčité a měkce ostnité, dlouhé 2 - 4cm a kališní lístky jsou úzce kopinaté a dlouhé 4 - 6mm. Plodem je 2nažka.

Vyhovují ji pobřežní písčité i zasolené půdy.

<https://www.rostliny.net/>