

## Centaurea nigra (Chrupa černá)

synonyma: *Centaurea austriaca*, *Centaurea babingtonii*, *Centaurea commutata*, *Centaurea debeauxii* subsp. *nemoralis*, *Centaurea inuloides*, *Centaurea jacea* subsp. *nigra*, *Centaurea leucocephala*, *Centaurea moritziana*, *Centaurea nemoralis*, *Centaurea nervosa*, *C. subsp. decipiens*, *C. subsp. nemoralis*, *C. var. decipiens*, *C. var. mairei*, *C. var. nemoralis*, *Centaurea nigrescens*, *Centaurea nigricans*, *Centaurea obscura*, *Centaurea pectinata* var. *fuscata*, *Centaurea phrygia*, *Centaurea rufescens*, *Cyanus niger*, *Cyanus plumosus*, *Cyanus pumilus*, *Jacea nemoralis*, *Jacea nigra*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Evropa, Západní Virginie

Pochází ze západní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Listy jsou dlouhé do 25cm a jsou hluboce laločnaté. Konce středních zákrovních listenů jsou 3úhlé, mají černé krátké třásně (nejdelší na vrcholu), přívěšky černé nebo hnědočerné. Kvete růžovofialovými květy. Plodem je nažka délky 3mm s krátkým chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aterrima*
- subsp. *carpetana*
- subsp. *endressii*
- subsp. *nigra*
- subsp. *rivularis*

<https://www.rostliny.net/>