

## Centaurea nigrescens (Chrupa černající)

synonyma: *Centaurea bracteata*, *Centaurea brevipappa*, *Centaurea carniolica*, *Centaurea dubia* subsp. *nigrescens*, *Centaurea dubia* subsp. *vochinensis*, *Centaurea jacea* subsp. *nigrescens*, *Centaurea jacea* subsp. *transalpina*, *Centaurea kochii*, *C. subsp. transalpina*, *C. subsp. vochinensis*, *C. var. rotundifolia*, *C. var. vochinensis*, *Centaurea rotundifolia*, *Centaurea schemnitzensis*, *Centaurea sciaphila*, *Centaurea subcordata*, *Centaurea transalpina*, *Centaurea trapezuntina*, *Centaurea tubulosa*, *Centaurea vochinensis*, *Cyanus nigrescens*, *Jacea carniolica*, *Jacea nigrescens*, *Jacea nigrescens* subsp. *transalpina*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Apeniny, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, J Alpy, JZ Evropa, Kalifornie, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Švýcarsko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z jihozápadní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 80cm. Dolní listy vejčitékopinaté, nedělené nebo lyrovitě peřenolaločné. Květenstvím je samostatný úbor, zákrovy vejčité až válcovité, střední zákrovní listeny mají krátké 3úhlé černé přívěsky, na okraji pravidelně brvitě, nezakrývající zcela zelené části listenů a vlastní květy jsou růžové až červenofialové. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *neapolitana* - endemit Itálie
- subsp. *nigrescens* (Chrupa černající pravá)
- subsp. *pinnatifida* - endemit Itálie
- subsp. *ramosa*
- subsp. *smolinensis*
- subsp. *transalpina*
- subsp. *vochinensis*

<https://www.rostliny.net/>