

Eremogone capillaris

synonyma: *Arenaria airifolia*, *Arenaria capillacea*, *Arenaria capillaris*, *Arenaria capillaris* f. *glandulifera*, *Arenaria capillaris* subsp. *formosa*, *Arenaria capillaris* subsp. *nardifolia*, *Arenaria capillaris* var. *glabrata*, *Arenaria capillaris* var. *glandulosa*, *Arenaria capillaris* var. *nardifolia*, *Arenaria formosa*, *Arenaria formosa* var. *glabra*, *Arenaria formosa* var. *latipetala*, *Arenaria laxmannii*, *Arenaria lychnidea*, *Arenaria nardifolia*, *Arenaria pungens*, *Arenaria setosa*, *Arenaria sibirica*, *Arenaria subulata*, *Arenaria subulata* var. *glabrata*, *Arenaria subulata* var. *glandulifera*, *Arenaria viscosa*, *Eremogone formosa*, *Eremogone nardifolia*, *Eremogone subulata*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Aljaška, Altaj, Kazachstán, Severozápadní Teritorium, Yukon

Roste na severu Severní Ameriky a na Sibiři v trsech až kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 25cm. Kmínky dřevnatí a jsou vzpřímené nebo vystoupavé, někdy žláznaté a někdy nasivělé. Přízemní listy jsou nitkovité, vytrvávající, dlouhé 2 - 8cm, široké do 1mm a lodyžní tvoří 1 - 3 páry. Květenství je 1 - 18tičetné, vlastní květy mají 0,2 - 2cm stopky, kališní lístky obvykle narůžovofialové, dlouhé 3 - 5mm, korunní lístky bílé, dlouhé 0,6 - 1cm. Plodem je 5 - 8mm dlouhá tobolka obsahující tmavěhnědá hrbolatá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *americana*/subsp. *americana*/E. *americana* - západ USA a západní Kanada; tobolky a semeníky mívají 3 - 8 buněčných chlupů

- var. *capillaris*/var. *nardifolia*/A. *formosa* - výška 5 - 20cm; stopky květů, semeníky i tobolky holé

<https://www.rostliny.net/>