

## Centaurea stoebe (Chrpa latnatá)

synonyma: Acosta chaubardii, Acosta maculosa, Acosta muretii, Acosta rhenana, Acosta stoebe, Acosta subalbida, Centaurea chaubardii, Centaurea maculosa subsp. albida, Centaurea maculosa subsp. chaubardii, Centaurea maculosa subsp. muretii, Centaurea maculosa subsp. rheana, Centaurea maculosa subsp. subalbida, Centaurea maculosa var. albida, Centaurea mierghii, Centaurea muretii, Centaurea paniculata subsp. maculosa, Centaurea pedemontana, Centaurea rhenana, C. subsp. maculosa, C. subsp. rhenana, Centaurea subalbida

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, V Evropu, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází ze střední, jižní a východní Evropy, do Severní Ameriky byla zavlečená. Patří mezi dvouletky (po odkvětu umírá). Dorůstá výšky 30 - 80cm. Lodyha má čtvercový průřez a je pokrytá chloupy. Listy jsou šedě plstnaté, 6 - 15cm dlouhé a úkrojky čárkovité. Kvete v bohaté latě z úborů, zákrovy jsou dlouhé 1 - 1,5cm, široké 0,5 - 1cm, zákrovní listeny jsou zeleně žilkované, koruna je růžová (i bělavá). Plodem je nažka délky 3 - 3,5mm s chmýrem délky 1,5 - 1,8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australis (Chrpa latnatá drobnoúborná)
- subsp. micranthos
- subsp. stoebe (Chrpa latnatá pravá)

Vyhovuje ji teplo, skalnaté svahy, stepi, meze, násypy, stráně, atp.

<https://www.rostliny.net/>