

Centaurea triumfettii (Chrupa chlumní)

synonyma: *Centaurea aichingeriana*, *Centaurea graminifolia*, *Centaurea triumfetti* subsp. *variegata*, *Centaurea variegata* var. *decurrentifolia*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Írán, Itálie, Německo, Polsko, SZ Afrika, Švýcarsko, Z Alpy

Pochází z jižní a střední Evropy, severozápadní Afriky a jihozápadní Asie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 80)cm. Listy mají špičku a bázi sbíhavou s lodyhou, povrch šedě až bíle plstnatý (na horní straně olysává), přízemní kopinaté, celokrajné nebo lyrovité zpravidla s 1 úkrojkem a lodyžní jsou dlouze kopinaté. Kvete v úboru růžovofialovými květy o průměru 4 - 5cm, prostřední zákrovní listy mají světlehnědé až stříbřitěbílé přívěsky s brvami 2x delšími než šířka hnědočerného lemu, zákrovní listy mají třásnitý okraj, jsou sbíhavé a paprskující květy modrofialové, středové fialové. Plodem je nažka. Patří mezi chráněné druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *axillaris*
- subsp. *lingulata* - výška 5 - 25cm; květenství dlouhé 1,3 - 2,4cm, široké 0,8 - 1,5cm; nažka délky 3 - 4,5mm

Vyhovují ji slunečná kamenitá místa a lesostepi.

<https://www.rostliny.net/>