

Centaurea boissieri

synonyma: *Acosta boissieri*, *Acosta boissieri* subsp. *atlantica*, *Acosta boissieri* subsp. *calvescens*, *Centaurea atlantica*, *Centaurea atlantica* subsp. *calvescens*, *C. var. atlantica*, *C. var. calvescens*, *C. var. rifana*, *Centaurea guilhelmi*, *Centaurea ochrolopha* subsp. *guilhelmi*, *Centaurea ochrolopha* var. *mauriti*, *Centaurea paniculata* subsp. *guilhelmi*, *Centaurea tenuifolia* subsp. *boissieri*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy vytvářejí růžici, jsou řapíkaté, peřenolaločné až peřnosečné. Květenství je dlouhé 1,2 - 1,6cm a široké 0,7 - 1,4cm Plodem je nažka délky 3,5 - 4,5mm s chmýrem délky 1 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *atlantica*
- subsp. *calvescens*
- subsp. *funkii*
- subsp. *mariolensis*
- subsp. *spachii*
- subsp. *transmalvana*
- subsp. *willkommii*

<https://www.rostliny.net/>