

Cerastium arvense (Rožec rolní)

synonyma: *Alsine arvensis*, *Centunculus angustifolius*, *Centunculus arvensis*, *Centunculus rigidus*, *Cerastium alpicolum*, *Cerastium ambiguum*, *Cerastium angustifolium*, *C. f. eglandulosum*, *C. f. glandulosum*, *C. subsp. arvum*, *C. var. arvense*, *C. var. eglandulosum*, *C. var. fueguianum*, *C. var. nervosum*, *C. var. parviflora*, *C. var. taimyrense*, *C. var. tatrae*, *Cerastium arvensiforme* var. *glandulosum*, *Cerastium brachycarpum*, *Cerastium busambareense*, *Cerastium caespitosum*, *Cerastium camphoratifolium*, *Cerastium carnosulum*, *Cerastium collinum*, *Cerastium corsicum*, *Cerastium fueguianum*, *Cerastium grahamii*, *Cerastium incanum*, *Cerastium insubricum*, *Cerastium mendocinense*, *Cerastium mutabile*, *Cerastium polyphyllum*, *Cerastium serpyllifolium*, *Cerastium strictum*, *Cerastium strictum* subsp. *tatrae*, *Cerastium uralense*, *Leucodonium arvense*, *Stellaria arvensis*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Karpaty, Západní Virginie

Roste v Evropě a Severní Americe (částečně i z Jižní Americe). Je velmi variabilním druhem. Patří mezi trvalky. Roste v řídkých trsech. Barva je sivozelená nebo šedozelená. Dorůstá výšky 5 - 45 (i 50)cm. Listy jsou lineární, několik cm dlouhé. Kvete bílými květy s 5ti okvětními lístky srdčitého tvaru. Plodem je 1,5cm tobolka obsahující několik hnědých semen. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *arvense* (Rožec rolní pravý)
- subsp. *glandulosum* - endemit Západních Karpat, výška 8 - 15cm, bílé nebo béžové květy, vyhovují mu suťová pole
- subsp. *lerchenfeldianum*
- var. *mitsumorense*
- subsp. *molle*
- subsp. *strictum*
- subsp. *suffruticosum*

<https://www.rostliny.net/>