

## Coreopsis tinctoria (Krásnoočko barevné)

synonyma: *Bidens tinctoria*, *Calliopsis bicolor*, *Calliopsis cardaminefolia*, *Calliopsis tinctoria*, *Coreopsis atkinsoniana*, *Coreopsis bicolor*, *Coreopsis cardaminefolia*, *Coreopsis gracilis*, *Coreopsis similis*, *Coreopsis stenophylla*, *C. f. atropurpurea*, *C. var. atkinsoniana*, *C. var. imminuta*, *C. var. similis*, *C. var. tinctoria*, *Diplosastera tinctoria*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste na prériích v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,6 - 0,9 (i 1)m. Listy jsou vstřícné, přizemní řapíkaté, 2x zpeřené, horní přisedlé, někdy střídavé a mají 3 - 7 úkrojků. Kvete drobnými žlutými květy v bohatých úborech na dlouhé stopce, jazykovité květy sterilní, široké, dlouhé do 2cm, zakončené 3mi zuby, barva žlutá, báze tmavěhnědá nebo růžovofialová, trubkovité květy oboupohlavné a žluté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Mahogany Midget' - květy červené
- 'Quills and Frills' - květy žluté s hnědými paprsky
- 'Radiata Tigrina' - květy žlutočerveně pruhované
- 'Roulette'
- 'Seashells' - květy hnědožluté

Vyhovuje mu úrodná dobře propustná půda, plné slunce a chráněné místo před větrem.

<https://www.rostliny.net/>