

Coccinia

synonyma: Cephalandra, Physedra, Staphylosyce

čeleď: Cucurbitaceae

Jedná se o plazivé či šplhavé trvalky nebo polokeře s jednoduchými nebo 2klanými úponky. Listy jsou jednoduché. Samčí květy se vyskytují samostatně nebo ve svazcích, mají 5 kališních lístků a 5 korunních lístků (u báze srostlých), tyčinky bývají 3 a samičí květy jsou samostatné. Plody jsou kulovité až válcovité, červené a obsahují velké množství semen.

Coccinia abyssinica

Coccinia adoensis

Coccinia aurantiaca

Coccinia barteri

Coccinia grandiflora

Coccinia grandis

synonyma: Bryonia grandis, C. indica

oblasti: Austrálie, Džibútí, Etiopie, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Karibik, Malajsie, Malajský poloostrov, Pákistán, Somálsko, Texas, Tropická Afrika

Roste v Austrálii, tropické Africe a Asii v podobě šplhavé či plazivé mírně dřevnatějící bohatě větvené trvalky s jednoduchými úponky a občas s chloupky. Dorůstá délky do 20m. Listy jsou široce vejčité až srdčité, vykrajovaně zubaté, dlanitě 3 - 5tilaločné, načervenalé, holé, dlouhé (3,5 -) 5 - 10 (i 11,5)cm, široké 3,5 - 15,5cm, laloky jsou 3úhlé až kosníkovité a řapíky jsou dlouhé (0,5 -) 2 - 5cm. Samčí květy vyrůstají po 1 - 4ks v krátkých stopkatých svazcích, vlastní květy mají 0,7 - 7cm stopky, kališní lístky kopinaté, dlouhé 2,5 - 6,5mm, na konci bývají načervenalá, koruna je zvonkovitá, nažloutlá, zeleně žilkovaná, korunní lístky jsou dlouhé 1,4 - 2,5cm, samičí květy vyrůstají samostatně, mají 0,4 - 2,5cm stopky, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 2 - 4mm, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 3,5cm. Plody jsou kulovité až eliptické, světleji pruhované, červené, dlouhé (2,5 -) 3 - 5 (i 7)cm, široké 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm a obsahují zploštělá asymetrická semena délky 6mm, šířky 2,5 - 3 (i 4)mm a tloušťky 1,5mm.

Odolává teplotám do 7°C.

Coccinia heterophylla

Coccinia hirtella

Coccinia indica

Coccinia keayana

Coccinia longicarpa

Coccinia mackenii

Coccinia megarrhiza

Coccinia microphylla

Coccinia mildbraedii

oblasti: Republika Kongo

Pochází z Konga. V zemi vytváří kulovitou hlízu (kaudex), které je na povrchu hrubá, světle korkovitá, podobná kůře. Na vrcholu vyrůstá několikametrové liániovité výhony s listy. Listy jsou klínovitě rozdělené na pět částí. Jsou pokryté chloupky, z vrchní strany sytě zelené, ze spodní našedivělé a jednotlivé části listu podélně zkroucené směrem vzhůru. Délka listu je 5cm.

Potřebuje dobře propustný lehký minerální substrát. Přes léta by měla být zálivka bohatá, v zimě ji omezte a snižte teplotu na 15°C.

Coccinia ogadensis

Coccinia pwaniensis

Coccinia quinqueloba

Coccinia racemiflora

Coccinia rehmanni

Coccinia rehmannii

Coccinia samburuensis

[Coccinia schliebenii](#)

[Coccinia senensis](#)

[Coccinia sessilifolia](#)

[Coccinia subsessiliflora](#)

[Coccinia trilobata](#)

[Coccinia ulugurensis](#)

[Coccinia variifolia](#)

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1078>

<https://www.rostliny.net/>