

Cymbalaria (Zvěšinec)

čeleď: Scrophulariaceae

Patří mezi trvalky. Pochází z Evropy. Jsou příbuzné rodům *Linaria* a *Antirrhinum*.

Vyhovuje jí plné slunce (kvůli květům) nebo polostín (více listů).

Cymbalaria aequitriloba

oblasti: Itálie

Pochází z jižní Evropy. Dorůstá výšky 5cm. Kvete žlutofialovými květy.

Cymbalaria glutinosa

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brevicalcarata* - endemit Itálie
- subsp. *glutinosa* - endemit Itálie

Cymbalaria hepaticifolia

Dorůstá výšky 5cm. Listy mají bílé žilkování.

Cymbalaria longipes

oblasti: Írán

Cymbalaria microcalyx (Zvěšinec trojlaločný)

oblasti: Chorvatsko, Turecko

Roste na severu východního středozeří jako jednoletka až víceletka. Povrch je řídce ochlupený. Stonky jsou znovu zakořeňující, převislé a dlouhé až 25cm. Listy jsou střídavé, obrysem kulaté až ledvinité, mělce 2 - 5tilaločné, široké do 1,5cm a řapíkaté. Kvete v paždí listů samostatnými 5tičetnými květy na dlouhé stopce, kalich je hluboce 5tičetný s nestejnými cípy, koruna je trubkovitě nálevkovitá, dlouhá 0,9 - 1,5cm, na bázi s 1 - 3mm dlouhou ostruhou, 2pyská, bílá nebo světlefialová s fialovou kresbou, horní pysk je 2dílný dolní 3dílný, na ústí koruny vypouklý se 2ma žlutými hrbolky, Plodem je kulovitá ochlupená tobolka průměru 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acutiloba*
- subsp. *ebellii*
- subsp. *minor*

Cymbalaria muelleri

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Cymbalaria muralis (Zvěšinec zední)

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Apeniny, Arkansas, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Irsko, Izrael, J Alpy, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Moldávie, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze evropského středozeší, jižní Alpy, Apeniny, Dinary, ale rozšířil se i k nám. Dorůstá délky (10 -) 15 - 40 (i 70)cm. Lodyha je jemná, fialové barvy, větvená a poléhavá až převislá. Listy jsou stálezelené, střídavé, oválné, srdčité a ledvinovité, dlouhé (1 -) 2,5 - 5cm, široké 0,8 - 4,5cm s (3 -) 5 - 7mi laloky a mají řapík délky 1 - 4,5 (i 5)mm. Kvete drobnými 6 - 8mm bílofialovými až fialovými 2pyskými květy se žlutými prašníky, ostruhou i korunou délky 1,5 - 3mm, kalich je dlouhý 1,5 - 2,5 (i 3)mm, má 5 laloků a stopka je dlouhá 2 - 3cm. Plodem je tobolka délky 3 - 5 (i 6)mm na stopce, která se ohýbá a snaží se vtlačit jej do podkladu. Semena jsou kulovitá velikosti 0,9 - 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. muralis (Zvěšinec zední pravý)
- subsp. visianii

Vyhovují jí vlhká skalnatá místa a zdi, nejlépe podél vody na plném slunci nebo polostínu. Přesto však je odolná na sucho. Ideální je vápenitá půda. Je mrazuvzdorná do -40°C.

Množí se semeny nebo dělením.

Cymbalaria pallida (Zvěšinec bledý)

oblasti: Střední Itálie

Patří mezi endemity Itálie. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Lodyha je plazivá. Listy jsou dlouze řapíkaté a horní převyšují vrcholek lodyhy. Koruna je světle modrofialová, dlouhá 1,5 - 3cm, ostruha je dlouhá 6 - 9mm a kalich je dlouhý 3 - 4,5mm.

Vyhovují mu skalnatá místa.

Cymbalaria pilosa

oblasti: J Evropa

Pochází z jižní Evropy.

Cymbalaria pluttula

Cymbalaria pubescens

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K276.php>

<http://botany.cz/cs/cymbalaria-muralis/>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/cymbalaria/>

<http://rostliny.prirodou.cz/scrophulariaceae/cymbalaria/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/zvesineczedni.htm>

<http://www.garten.cz/a/cz/5624-cymbalaria-muralis-zvesinec-zedni/>

<https://www.rostliny.net/>