

# Darmera (Darmera)

čeleď: Saxifragaceae

Existuje pouze 1 druh.

## Darmera peltata (Darmera štítnatá)

synonyma: Leptarrhena inundata, Peltiphyllum peltatum, Saxifraga peltata

oblasti: Kalifornie, Oregon, Utah

Roste v okolí bystřin v lesích západu USA (Kalifornie a Oregon) jako trvalka. Dorůstá výšky až 1m. Pod zemí vytváří masitý oddenek. Listy jsou zakulacené, hluboce laločnaté, tmavě zelené, průměru až 50 (i 80)cm a řapíky jsou dlouhé až 1,5m. Květenstvím je vysoké 40 - 80cm, zakončené kulovitým okolíkem, vlastní květy jsou bohaté, bílé nebo narůžovělé s růžovým středem o průměrem 1,5cm z 5ti korunních lístků. Na podzim se barví do červena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Nana' - výška 30cm

Vyhovují jí vlhké až bažinaté půdy bohaté na živiny a polostín nebo stín.

Množí se dělením nebo semeny.

## Darmera trichophylla

Další informace:

<http://botany.cz/cs/darmera-peltata/>

<http://www.abecedazahrady.cz/default.aspx?server=1&catalog=1&catitem=6075>

<https://www.rostliny.net/>