

Coccinia grandis

synonyma: Bryonia grandis, Coccinia indica

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Austrálie, Džibútí, Etiopie, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Karibik, Malajsie, Malajský poloostrov, Pákistán, Somálsko, Texas, Tropická Afrika

Roste v Austrálii, tropické Africe a Asii v podobě šplhavé či plazivé mírně dřevnatějící bohatě větvené trvalky s jednoduchými úponky a občas s chloupky. Dorůstá délky do 20m. Listy jsou široce vejčité až srdčité, vykrajovaně zubaté, dlanitě 3 - 5tilaločné, načervenalé, holé, dlouhé (3,5 -) 5 - 10 (i 11,5)cm, široké 3,5 - 15,5cm, laloky jsou 3úhlé až kosníkovité a řapíky jsou dlouhé (0,5 -) 2 - 5cm. Samčí květy vyrůstají po 1 - 4ks v krátkých stopkatých svazcích, vlastní květy mají 0,7 - 7cm stopky, kališní lístky kopinaté, dlouhé 2,5 - 6,5mm, na konci bývají načervenalá, koruna je zvonkovitá, nažloutlá, zeleně žilkovaná, korunní lístky jsou dlouhé 1,4 - 2,5cm, samičí květy vyrůstají samostatně, mají 0,4 - 2,5cm stopky, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 2 - 4mm, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 3,5cm. Plody jsou kulovité až eliptické, světleji pruhované, červené, dlouhé (2,5 -) 3 - 5 (i 7)cm, široké 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm a obsahují zploštělá asymetrická semena délky 6mm, šířky 2,5 - 3 (i 4)mm a tloušťky 1,5mm.

Odolává teplotám do 7°C.

<https://www.rostliny.net/>