

# Strongylodon

čeleď: Fabaceae

Roste v jihovýchodní Asii, Polynésii ale také na Madagaskaru, Srí Lance a v severovýchodní Austrálii v podobě stálezelené nebo opadavé dřevité liány nebo keře. Květenstvím je dlouhý hrozen. Plodem je lusk. Nejznámějším druhem je *S. macrobotrys*.

Potřebuje dobře propustnou vlhkou půdu bohatou na živiny, polostín a minimální teplotu 18°C.

Množí se semeny, stonkovými řízkami nebo hřížením.

## Strongylodon archboldianus

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Papui-Nové Guineji.

## Strongylodon caeruleus

synonyma: *S. paucinervis*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

## Strongylodon celebicus

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste v Indonésii a Sulawesi.

## Strongylodon crassifolius

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

## Strongylodon craveniae

synonyma: *S. campenoni*, *S. campenonii*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

## Strongylodon decipiens

synonyma: *S. decipiens* var. *imbricata*, *S. decipiens* var. *imbricatus*

oblasti: Papua-Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste na Papui-Nové Guineji, Indonésii a Sulawesi.

### Strongylodon elmeri

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

### Strongylodon loheri

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

### Strongylodon lucidus

synonyma: *Glycine lucida*, *Rhynchosia lucida*, *S. pseudolucidus*, *S. secundus*, *S. siderospermus*

oblasti: Madagaskar, Nová Kaledonie, Srí Lanka, SV Austrálie, Tichý oceán

Roste na Madagaskaru, Srí Lance, jihovýchodní Asii, Austálii, Nové Kaledonii a v pacifiku.

### Strongylodon macrobotrys (Smaragdová liána)

synonyma: *S. megaphyllus*, *S. warburgii*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stálezelené dřevnaté liány. Dorůstá výšky až 18 (i 20)m. Kmínek je lesklý, růžovofialovozelený až hnědočerný. Listy jsou střídavé, stálezelené, tmavězelené, v mládí bronzovorůžové, 3četné, vlastní lístky dlouze obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 7 - 13cm a mají krátké řapíky. Kvete v párech nebo přeslenech na dlouhé stopce, vlastní květ má drápovitý člunek, je modrozelený, má délkou až 7,5cm a jsou seskupené v převislých válcovitých až 75četných hroznech s délkou do 0,9 (i 3)m. Plodem je až 15cm dlouhý nepukavý lusk obsahující do 12ti ks semen.

### Strongylodon madagascariensis

synonyma: *Chadsia lantziana*, *S. catati*, *S. lantzianum*, *S. lastellianum*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Strongylodon pulcher

synonyma: *S. agusanensis*, *S. mindanaensis*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

### Strongylodon ruber

oblasti: Havajské ostrovy, Queensland

Pochází z Filipín.

### Strongylodon zschokkei

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/strongylodon-macrobotrys/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Strongylodon>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3152>

<https://www.rostliny.net/>