

## Echinops ritro (Bělotrn modrý)

synonyma: E. var. tenuifolius, Echinops tauricus, Echinops tenuifolius

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Idaho, Itálie, J Ural, JV Evropa, Katalánsko, Montana, Palestina, Rusko, Sicílie, Washington

Roste od Iberského poloostrova po Palestinu jako trvalka. Dorůstá výšky i šířky (0,2 -) 0,6 - 0,9 (i 1,2)m. Stonek je bílý. Listy jsou obrysem kopinaté až 3úhlé, kožovité, dlouhé 5 - 20cm, mají 1 - 2x hluboké peřenosečné ostnitě žláznatě ochlupené úkrojky a spodní strana je plstnatá. Kvete v strboulech o průměru (2,5 -) 4 - 4,5 (i 4,8)cm, cípy trubkovitých květů jsou široce nálevkovité, čárkovité a bleděmodré až fialové. Plodem je válcová nažka. Hodí se k sušení. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. meyeri/E. meyeri/var. meyeri
- subsp. ritro (Bělotrn modrý pravý) - západní a střední Evropa, výška 20 - 80cm, mírně větvený, délka 2x peřenoklaných listů 5 - 20cm
- subsp. ruthenicus (Bělotrn modrý ukrajinský) - jihovýchodní, východní a střední Evropa až západní Sibiř; výška (0,3 -) 0,6 - 0,7 (i 1)m, 1 - 6 větví; přizemní růžice 2x peřenoklaných až peřenodílných kožovitých pavučinatých lesklých listů; průměr květního strboulu (3 -) 3,5 - 4,5cm, květy šedofialové, štětinovité listeny na bázi zákrovu z 1/2 srostlé
- subsp. sartorianus
- subsp. siculus/E. siculus - endemit Itálie
- subsp. thracicus
- 'Veitch's Blue'

Vyhovuje mu plné slunce, kamenité stráně a sušší dobře propustná půda.

<https://www.rostliny.net/>