

# Lepyrodiclis (Osevnatka)

čeleď: Caryophyllaceae

## Lepyrodiclis holosteoides (Osevnatka plevelová)

oblasti: Afganistán, Idaho, Írán, Kavkaz, Mongolsko, Nepál, Pákistán, SZ Čína, Ťan-šan, Turecko, Washington, Xizang (Tibet)

Roste v Íránu, na Kavkaze, Turecku, Afganistánu, Pákistánu Nepálu, Tibetu, Číně a Mongolsku jako jednoletka. Dorůstá výšky do 40cm. Stonek může být větvený, vystoupavý až vzpřímený a může být ochlupený. Listy jsou kopinaté, obkopinaté nebo čárkovité, špičaté, přisedlé a dlouhé 1,5 - 7cm. Květenství je latnaté, rozložitě, listeny se podobají listům, vlastní květy mají kalich zvonkovitý, kališní lístky kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 7mm, korunní lístky jsou bílé a délky 2/3 kališních. Plodem je tobolka ve vytrvalém kalichu a obsahuje semena průměru 2mm.

## Lepyrodiclis holosteoides x stellarioides

oblasti: Írán

## Lepyrodiclis stellarioides

synonyma: *L. holosteoides* var. *stellarioides*

oblasti: Afganistán, Bajkal, Balúčistán, Írán, Kavkaz, Pamír, Ťan-šan

Roste na Kavkaze, Bajkalu, Pamíru, Ťan-šanu, Afganistánu a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky 30cm. Stonek je slabý a může být větvený. Listy jsou podlouhlé až úzce kopinaté a drobně zubovitě ochlupené. Květenství je latnaté, chudé, vlastní květy mají kalich válcovitý, kališní lístky podlouhlé až kopinaté, špičaté, dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky jsou světle růžové min. stejné délky jako kališní a hluboce zubaté.

## Lepyrodiclis tenera

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán, Z Himálaj

Roste v Himálaji, Kašmíru v Afganistánu a Pákistánu jako jednoletka s mnoha větvenými stonky. Listy jsou vejčité až podlouhlé a řapíkaté. Květy mají kalich válcovitý, kališní lístky kopinaté a špičaté, korunní lístky jsou podlouhlé a 2x delší kališních.

<https://www.rostliny.net/>