

## Erodium cicutarium (Pumpava obecná)

synonyma: *Erodium albidum*, *Erodium allotrichum*, *Erodium alsiniflorum*, *Erodium ambiguum*, *Erodium arenarium*, *Erodium atomarium*, *Erodium boraeae*, *Erodium carneum*, *Erodium chaerophyllum*, *E. f. chaerophyllum*, *E. subsp. bipinnatum*, *E. subsp. dunense*, *E. subsp. ontigolanum*, *E. subsp. zairae*, *E. var. arenicola*, *E. var. immaculatum*, *E. var. triviale*, *Erodium cicutifolium*, *Erodium commixtum*, *Erodium danicum*, *Erodium dissectum*, *Erodium filicinum*, *Erodium glutinosum*, *Erodium himalayanum*, *Erodium hirsutum*, *Erodium immaculatum*, *Erodium maculatum*, *Erodium melanostigma*, *Erodium millefolium*, *Erodium minutiflorum*, *Erodium moranense*, *Erodium pallidiflorum*, *Erodium parviflorum*, *Erodium petroselinum*, *Erodium pilosum*, *Erodium pimpinellifolium*, *Erodium praetermissum*, *Erodium sabulicolum*, *Erodium subalbidum*, *Erodium tenuisectum*, *Erodium triviale*, *Erodium verbenifolium*, *Geranium arenicolum*, *Geranium chaerophyllum*, *Geranium cicutarium*, *Geranium petroselinum*, *Geranium pimpinellifolium*

čeleď: Geraniaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arabský poloostrov, Arizona, Arkansas, Arménie, Baleáry, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Labrador, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sibiř, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Roste od středozeší po střední Asii jako jednoletka (i dvouletka). Dorůstá výšky (4 -) 20 - 50 (i 70)cm. Lodyha je poléhavá až vystoupavá. Palisty jsou široce vejčitékopinaté, ochlupené a dlouhé 2,5 - 5mm. Listy jsou lichozpeřené, peřenodílné až peřenosečné, více než do 1/2 zastřižené, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,8 - 2,7cm, vlastní lístky jsou hluboce peřenoklané. Kvete růžovými až růžovofialovými květy na 1,5 - 6,5cm stopce v (2 -) 3 - 8 (i 9)tičetném květenství, listeny jsou vejčité, špičaté, kališní lístky jsou vejčitékopinaté, zašpičaté, ochlupené, dlouhé 3 - 4mm (za plodu až 6 (i 7,5)mm) a korunní lístky jsou dlouhé 0,4 - 0,9 (i 1,2)cm. Plod má zobanitý konec a délku 4 - 7cm. Může být vystřelován. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cutarium*
- subsp. *jacquinianum*

Vyhovují jí travnaté pláně podél pobřeží, sušší půdy, zahrady, písčiny, okraje cest, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>