

Galium verrucosum (Svízel bradavčitý)

synonyma: *Aparine verrucosa*, *Galium granulatum*, *Galium saccharatum*, *Galium vaillantii* var. *halophilum*, *G.* var. *halophilum*, *Valantia aparine*, *Valantia granulata*, *Valantia saccharata*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Francie, Itálie, Izrael, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Makaronésie, Maroko, Michigan, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko

Pochází ze středozeší. Dorůstá výšky 3 - 56cm. Listy jsou na okraji a někdy i na spodní straně na centrální žilce osténkaté až hladké (při bázi zpětně), vyrůstají ve (4 -) 6 (i 7)mičetných přeslenech, mají délku 0,22 - 1,8 (i 2,7)cm a šířku 0,6 - 5,2mm. Lodyha je na hranách řídce osténkatá až hladká. Květy mají v průměru 1,7 - 2,8 (i 3,7)mm. Plod má kuželovitěbradavičnatý povrch a průměr 4 - 6mm. Stopky jsou víceméně přímé, dlouhé do 2mm. U nás je neznámý A1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *halophilum* - endemita Itálie
- subsp. *verrucosum* (Svízel bradavčitý pravý)

<https://www.rostliny.net/>