

# Santolina chamaecyparissus (Svatolina cypřišová)

synonyma: Abrotanum foemina, Santolina marchii

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Georgia, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Massachusetts, Německo, Severní Karolína, Střední střeozemí, Z Střeozemí

Roste ve střeozemí v podobě 1/2kulovitého polokeře. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 60 (i 90)cm, u nás max. 50cm v kompaktním habitu. Stonky i listy mají modrostříbrnou barvu a sterilní jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, drobné, neopadavé, při dotyku aromatické, čárkovité, peřenosečné, dlouhé 0,6 - 2 (i 2,5)cm s cípy délky 2 - 3mm. Kvete žlutými květy v úboru šířky 0,6 - 1,2cm se zákrovem délky 0,4 - 0,8 (i 1)cm a kýlnatými listeny ve více řadách. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,5mm. Hodí se jako půdokryvná rostlina. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. chamaecyparissus (Svatolina cypřišová pravá)
- 'Lambrook Silver' - stříbřité listy
- subsp. pecten
- 'Smallness' - miniaturní; šedo zelený list
- subsp. squarrosa

Potřebuje dobře propustnou sušší zem a plné slunce. Je mrazuvzdorná do -24°C, ale půda musí být suchá.

<https://www.rostliny.net/>