

Gomphocarpus fruticosus

synonyma: *Apocynum salicifolium*, *Asclepias angustifolia*, *Asclepias cornuta*, *Asclepias crinita*, *Asclepias fruticosa*, *Asclepias glabra*, *Asclepias salicifolia*, *Asclepias virgata*, *Gomphocarpus angustifolius*, *Gomphocarpus arachnoideus*, *Gomphocarpus cornutus*, *Gomphocarpus crinitus*, *G. f. brasiliensis*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Arabský poloostrov, Džibútí, Etiopie, J Afrika, Katalánsko, Keňa, Somálsko, Súdán, Uganda

Roste ve východní Africe v podobě bylinky až řídkého polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 3)m. Větve jsou metlovité a ochlupené. Listy jsou vstřícné, čárkovité, špičaté, řídce ochlupené, dlouhé 2 - 10 (i 12)cm, široké 0,3 - 1,1 (i 1,3)cm, okraj je pohnutý a řapíky jsou krátké. Kvete v 4 - 5 (i 12)tičetných vrcholičnatých lotech, vlastní květy jsou stopkaté, koruna nažloutlá, 5tičetná, okraje jsou ochlupené a kališní lístky jsou dlouhé 2 - 5mm. Plodem je až štětinatý měchýřek délky 4 - 7cm, průměru 2 - 3cm a obsahuje hnědá člunkovitá semena délky 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fruticosus* - Afrika
- subsp. *setosus* - Arabský poloostrov

Vyhovuje mu plné slunce a křoviny.

<https://www.rostliny.net/>