

Geranium robertianum (Kakost smrdutý)

synonyma: *Geranium eriophorum*, *Geranium graveolens*, *Geranium lebelii*, *Geranium lindleyanum*, *Geranium mosquense*, *Geranium palmatisectum*, *Geranium purpureum* var. *littorale*, *G. f. albiflorum*, *G. var. albiflorum*, *G. var. eriophorum*, *G. var. glabrinux*, *G. var. incisum*, *Geranium rubellum*, *Geranium scopulicolum*

čeleď: Geraniaceae

oblasti: Albánie, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Baleáry, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Sibiř, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Himálaj, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Severní Americe a od Kanárských ostrovů po Sibiř a Himálaj jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 60)cm (v závislosti na světelných podmínkách). Může být načervenalý. Stonek je vzpřímený. Palisty jsou dlouhé 2 - 3mm. Druhové jméno je odvozeno od nepříjemného zápachu uvolňujícího se při promnutí listů, ty jsou žláznatě ochlupené, obrysem 3úhlé, dlouhé 3 - 4cm, široké 3 - 7,5cm, s hlubokými 3 - 5ti peřenolaločnými laloky téměř až ke středu čepele, řapíky načervenalé, ochlupené a dlouhé 1,8 - 4,4cm. Květenství je 2květé, vlastní květy jsou růžové s bělavými proužky, kališními lístky jsou vejčité, dlouhé (5-) 6 - 7mm, široké 1,7 - 3,5mm a korunními lístky 3žilné, dlouhé 1 - 1,6cm a široké 3 - 6,5mm. Plod nepřesahuje délku 2,5 - 3,5cm, zobák má délku 0,8 - 1,1cm, semena jsou mírně eliptická hnědočervená a dlouhá 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album' - bílý velkokvětý
- 'Celtic White' - zakrslý
- subsp. *purpureum*
- subsp. *robertianum* (Kakost smrdutý pravý)

Vyhovuje mu polostín a vlhčí půda bohatá na živiny v lesích, sutích, křovinách, při zídkách, atp.

Množí se semeny.