

Xanthisma spinulosum

synonyma: *Amellus spinulosus*, *Aster pinnatifidus*, *Aster spinuliger*, *Chrysopsis lamarckii*, *Dieteria spinulosa*, *Eriocarpum australe*, *Eriocarpum spinulosum*, *Haplopappus coulteri*, *Haplopappus spinulosus*, *Haplopappus spinulosus* subsp. *australis*, *Haplopappus spinulosus* subsp. *cotula*, *Haplopappus spinulosus* subsp. *laevis*, *Haplopappus spinulosus* var. *canescens*, *Haplopappus spinulosus* var. *glaber*, *Haplopappus spinulosus* var. *turbinellus*, *Haplopappus texensis*, *Machaeranthera australis*, *Machaeranthera laevis*, *Machaeranthera pinnata*, *Machaeranthera texensis*, *Sideranthus australe*, *Sideranthus australis*, *Sideranthus cotula*, *Sideranthus laevis*, *Sideranthus machaeranthera*, *Sideranthus puberulus*, *Sideranthus spinulosus*, *Sideranthus turbinellus*, *Sideranthus wootonii*, *Starkea pinnata*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Arizona, Chihuahua, Coahuila, Durango, Iowa, Kalifornie, Kalifornský záliv, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Nebraska, Nuevo León, Oklahoma, San Luis Potosí, Saskatchewan, Sonora, Tamaulipas, Texas, Zacatecas

Roste od Kanady po Mexiko v podobě trvalky až polokeře. Dorůstá výšky 0,1 - 1m. Povrch je šedozelený. Vytváří křovitý kořen. Stonky jsou vzpřímené až vystoupavé a od báze dřevnatí. Listy jsou 1 - 2x peřenoklanné s tenkými úkrojky, bazální jsou dlouhé 1,5 - 3cm, široké 0,8 - 1,3cm, lodyžní jsou kopinaté, celokrajné nebo zubaté, mohou být žláznaté, dlouhé 0,2 - 8cm a široké 0,1 - 3cm. Kvete v úbořech. Plodem je nažka s chmýrem o délce 4 - 6mm.

Vyhovují mu prairie či okraje silnic.

<https://www.rostliny.net/>