

Tuberaria lignosa

synonyma: *Cistus nervosus*, *Cistus plantaginifolius*, *Cistus tuberaria*, *Helianthemum tuberarium*, *Helianthemum lignosum*, *Helianthemum tuberaria*, *Tuberaria melastomatifolia*, *Tuberaria vulgaris*, *Xolantha tuberaria*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Sardínie, Sicílie, Tunisko

Roste v jihozápadní Evropě, střeozemí a severní Africe včetně kanárských ostrovů v podobě polokeře. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 50)cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou široce kopinaté a řapíkaté, hvězdicovitě ochlupené, dlouhé (3 -) 5 - 7 (i 9,5)cm, široké 1 - 1,5 (i 3)cm, lodyžní listy jsou vstřícné, menší a přisedlé. Kvete žlutými květy o průměru 2 - 3cm v jednostranném hroznu či vijanu, vlastní květy mají 1 - 2,5cm stopky, kališní listy jsou dvojího typu, 2 vnější jsou čárkovité, dlouhé 0,4 - 0,6 (i 1,1)cm, 3 vnitřní široce kopinaté, dlouhé 0,9 - 1,5cm a široké 0,5 - 1cm, korunní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5cm a semeník má jediné pouzdro. Plodem je na vrcholu ochlupená 3chopňová tobolka délky (6 -) 6,5 - 7,5 (i 8)mm a šířky 4,5 - 5mm.

Vyhovuje jí středně úrodná a vlhká dobře propustná půda a polostín.

Vyhovují jí kyselé půdy a řídké lesy s dobře propustnou půdou.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>